BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR DE GEBRUIK(ST)ER

TRINIPATCH

Nitroglycerine

Lees de hele bijsluiter zorgvuldig door voordat u start met het gebruik van dit geneesmiddel.
- Bewaar deze bijsluiter. Het kan nodig zijn om deze nog eens door te lezen.
- Heeft u nog vragen, raadpleeg dan uw arts of apotheker.
- Dit geneesmiddel is aan u persoonlijk voorgeschreven. Geef dit geneesmiddel niet door aan anderen. Dit geneesmiddel kan schadelijk voor hen zijn, zelfs als de verschijnselen dezelfde zijn als waarvoor u het geneesmiddel heeft gekregen.
- Wanneer één van de bijwerkingen ernstig wordt of als er bij u een bijwerking optreedt die niet in deze bijsluiter is vermeld, raadpleeg dan uw arts of apotheker.

In deze bijsluiter:

1. Wat is TRINIPATCH en waarvoor wordt het gebruikt
2. Wat u moet weten voordat u TRINIPATCH gebruikt
3. Hoe wordt TRINIPATCH gebruikt
4. Mogelijke bijwerkingen
5. Hoe bewaart u TRINIPATCH
6. Aanvullende informatie

1. Wat is TRINIPATCH en waarvoor wordt het gebruikt

Farmacotherapeutische groep: TRINIPATCH is een nitraatderivaat en wordt op de huid aangebracht. Het werkt door verwijding van de bloedvaten.

Therapeutische indicaties: Het voorkomen van aanvallen van hartkramp, en dit alleen of in combinatie met andere geneesmiddelen tegen hartkramp zoals bètablokkers en/of calciumantagonisten.
TRINIPATCH is niet geschikt om een plotse aanval van hartkramp tegen te gaan.

2. Wat u moet weten voordat u TRINIPATCH gebruikt

Gebruik TRINIPATCH niet in volgende gevallen:
- overgevoeligheid voor nitraten of voor één van de andere bestanddelen van de pleister;
- slechte bloedsomloop te wijten aan een slechte werking van het hart;
- verhoogde druk binnen de schedel;
- ernstige bloedarmoede;
- lage bloeddruk;
- schoktoestand;
- hartzwakte.

De pleister moet verwijderd worden vóór het toedienen van een uitwendige elektrische schok of vóór een behandeling die gebruikt maakt van elektriciteit.

Gebruik van Trinipatch in combinatie met andere geneesmiddelen
Vertel uw arts of apotheker als u andere geneesmiddelen gebruikt of kort geleden heeft gebruikt. Dit geldt ook voor geneesmiddelen die u zonder voorschrift kunt krijgen.

Gezien de mogelijke interacties, wordt het gelijktijdige gebruik van TRINIPATCH met remmers van het type-5 fosfodiësterase zoals sildenafil (Viagra), vardenafil (Levitra) en tadalafil (Cialis) - geneesmiddelen gebruikt bij de behandeling erectiestoornissen - gecontra-indiceerd.

Gezien de mogelijke interacties, wordt het gelijktijdige gebruik van TRINIPATCH met sildenafil (Viagra), vardenafil (Levitra) en tadalafil (Cialis) - geneesmiddelen gebruikt bij de behandeling erectiestoornissen - binnen de 24 u na het gebruik van deze geneesmiddelen en het gebruik van deze geneesmiddelen binnen het uur na verwijdering van TRINIPATCH gecontra-indiceerd.

De behandeling met TRINIPATCH, kan het risico op een bloeddrukdaling versterken, vooral in rechtstaande houding en in combinatie met geneesmiddelen die de bloedvaten verwijden, geneesmiddelen die de aanmaak van urine verhogen, geneesmiddelen tegen hoge bloeddruk, tegen depressie (tricyclische antidepressiva), tegen geestesziekten (neuroleptica) of geneesmiddelen die hydroergotamine bevatten.

Het gelijktijdige gebruik van TRINIPATCH met sildenafil (Viagra), vardenafil (Levitra) en tadalafil (Cialis) - geneesmiddelen gebruikt tegen erectiestoornissen - kan een belangrijke daling van de bloeddruk veroorzaken.

Wees extra voorzichtig als u ook andere geneesmiddelen gebruikt. Lees dan ook de rubriek “gebruik van TRINIPATCH in combinatie met andere geneesmiddelen”.
- Een abrupte stopzetting van de behandeling dient vermeden te worden omdat anders een aanval van hartkramp kan uitgelokt worden. De instructies van uw arts strikt opvolgen.
- Bij het aanbrengen van de pleister gaat u best zitten of liggen; dit vermijdt een bloeddrukdaling die vooral kan voorkomen indien u nog andere geneesmiddelen neemt om de bloeddruk te verminderen.
- Bij een hartinfarct of een plotse slechte werking van het hart, deze behandeling niet gebruiken, tenzij onder strikte controle van uw dokter.
- De geneesmiddelen die de bloedvaten verwijden, die de bloeddruk doen dalen, en deze die de urineproductie verhogen, kunnen de bloeddrukdaling van nitraatderivaten vergroten, voornamelijk bij oudere patiënten.

Raadpleeg uw arts indien een van bovenvermelde waarschuwingen voor u van toepassing is of indien dit in het verleden het geval is geweest.

Gebruik van TRINIPATCH met voedsel en drank
Het drinken van alcohol tijdens de behandeling dient vermeden te worden, omdat deze een bloeddrukdaling kan veroorzaken met duizelingen met een mogelijke val tot gevolg.

Zwangerschap
Gebruik Trinipatch niet tijdens de zwangerschap.
Vraag uw arts of apotheker om advies voordat u een geneesmiddel inneemt.

Borstvoeding
Gebruik Trinipatch niet tijdens de borstvoeding.
Vraag uw arts of apotheker om advies voordat u een geneesmiddel inneemt.

Rijvaardigheid en het gebruik van machines
Vooral bij het begin van de behandeling en in geval van een lage bloeddruk, dient men voorzichtig te zijn bij het besturen van voertuigen en het gebruik van machines.

Belangrijke informatie over enkele bestanddelen van TRINIPATCH
---

3. Hoe wordt TRINIPATCH gebruikt

Volg strikt deze instructies op tenzij uw arts u er andere gegeven heeft. Raadpleeg bij twijfel uw arts of apotheker.
Uw arts zal u zeggen hoe lang u TRINIPATCH moet gebruiken. Stop uw behandeling niet voortijdig.
De gebruikelijke dosering in het begin van de behandeling bedraagt 1 pleister TRINIPATCH 5 per dag. Indien u niet voldoende reageert op de medicatie kan uw dokter de dosis verhogen.

Gebruiksaanwijzing
De pleister aanbrengen op een gezonde (zonder wonden of roodheid), weinig behaarde, schone (zonder zalfresten) en droge huid (de huid goed wassen en afdrogen), bijvoorbeeld op zijflanken van de borstkas. De pleister mag ook op andere plaatsen van het lichaam gekleefd worden, behalve op de borsten.

Het aanbrengen van TRINIPATCH transparant
- de pleister uit het zakje nemen,
- de pleister zodanig vasthouden dat u de beschermingsblaadjes naar u toehoudt (figuur A),
- de pleister plooien en één beschermingsblaadje aftrekken (figuur B),
- het klevende gedeelte op de huid kleven (figuur C),
- het tweede blaadje aftrekken (figuur D),
- de transdermale pleister met de handpalm of de vingers gedurende een tiental seconden aanduwen en goed drukken op de kanten (figuur E),
- de handen wassen.



Elke dag, de gebruikte pleister verwijderen en weggooien en een nieuwe pleister aanbrengen op een andere plaats. Het is best 4 tot 5 dagen te wachten alvorens een pleister op een eerder gebruikte plaats te kleven, dit om eventuele irritatie te vermijden. Om de resten van de lijm van een pleister te verwijderen, kunt u best een aangepast oplosmiddel gebruiken zoals alcohol of ether.

Indien de pleister spontaan loskomt (bijvoorbeeld bij sterke transpiratie), dient men de loskomende pleister te verwijderen en weg te gooien en een nieuwe pleister op een andere plaats aan te brengen.
Ritme van aanbrengen
De richtlijnen van uw dokter strikt volgen. Gewoonlijk dient u één pleister per dag te gebruiken met de mogelijkheid enkele uren pleistervrij te blijven, afhankelijk van de instructies die uw dokter u geeft.
Tijdens het dragen
Indien de pleister goed op de huid kleeft, kunt u zich baden, een douche nemen of sport beoefenen.

Wat u moet doen wanneer u TRINIPATCH bent vergeten :
Geen beschikbare gegevens.

Als u stopt met het gebruik van TRINIPATCH
Raadpleeg steeds uw arts indien u de behandeling zou willen stoppen.

Wat u moet doen als u meer van TRINIPATCH heeft gebruikt dan u zou mogen:
Hoge doses nitroglycerine kunnen uitgesproken algemene reacties geven zoals een bloeddrukdaling, een versneld hartritme, een flauwte. In tegenstelling tot de geneesmiddelen met nitroglycerine die men via de mond inneemt, kan de werking van TRINIPATCH snel onderdrukt worden door de pleister af te trekken.
Het opheffen van de benen in liggende houding kan een bloeddrukdaling of een flauwte tegengaan.
Bij overdosering met TRINIPATCH, onmiddellijk uw geneesheer of uw apotheker raadplegen of contact opnemen met het Antigifcentrum (070/245245).

4. Mogelijke bijwerkingen

Zoals alle geneesmiddelen kan TRINIPATCH bijwerkingen veroorzaken.

De volgende bijwerkingen komen vaak (tussen 1/10 en 1/100 patiënten), soms (tussen 1/100 en 1/1.000 patiënten), zelden (tussen 1/1.000 en 1/10.000 patiënten) of zeer zelden (minder dan 1/10.000) voor:

Zenuwaandoeningen: *vaak*: hoofdpijn – *zeer zelden*: duizeligheid.
Slaperigheid, zwakte, troebel zicht, geestelijk veroorzaakte opwinding, duizeligheid en draaierigheid.
In het begin van de behandeling kan hoofdpijn optreden, maar nadien vermindert deze. Het aanhouden van hoofdpijn tijdens een intermitterende behandeling is mogelijk. Indien er geen verbetering optreedt na een behandeling van de symptomen dient de dosis verminderd te worden of de behandeling stopgezet te worden.

Hartaandoeningen: *zelden*: verhoogde polsslag

Bloedstelselaandoeningen: *zelden*: verlaagde bloeddruk vooral bij het overgaan van een liggende houding naar een rechtstaande houding, flush.
Een daling van de bloeddruk kan optreden vooral in rechtstaande houding.

Maagdarmstelselaandoeningen: *zeer vaak*: misselijkheid, braken

Spieraandoeningen: krampen

Huidaandoeningen: *soms*: op de plaats waar de pleister is aangebracht kan huidontsteking, roodheid, jeuk, brandende irritatie of huidirritatie optreden. De lokale huidreacties zijn banaal en laten de voortzetting van de behandeling toe. Deze voorvallen zijn zelden indien men regelmatig de plaats van aanbrengen verandert. Deze toedieningswijze sluit het grootste gedeelte van maagdarmstelselbijwerkingen uit die regelmatig met tabletten optreden.

Wanneer er bij u een bijwerking optreedt die niet in deze bijsluiter is vermeld en welke u als ernstig beschouwt, of indien u een van de vermelde bijwerkingen als ernstig gewaarwordt, meldt dit aan uw arts of uw apotheker.

5. Hoe bewaart u TRINIPATCH

Buiten het zicht en het bereik van kinderen bewaren. Bewaren beneden 25°C. Vervaldatum: gebruik TRINIPATCH niet meer na de vervaldatum die staat vermeld op de doos na de vermelding “Niet gebruiken na” of “EXP”. De vervaldatum verwijst naar de laatste dag van die maand.

6. Aanvullende informatie

Wat bevat TRINIPATCH
Het *werkzame bestanddeel* is nitroglycerine.
- Trinipatch 5 : Nitroglycerin. 22,4 mg pro system. transderm. 7 cm^2 in vivo liberat. ca 5 mg/24h.
- Trinipatch 10 : Nitroglycerin. 44,8 mg pro system. transderm. 14 cm^2 in vivo liberat. ca 10 mg/24h.
- Trinipatch 15 : Nitroglycerin. 67,2 mg pro system. transderm. 21 cm^2 in vivo liberat. ca 15 mg/24h.

De andere bestanddelen zijn sorbitan monooleas, acryl. copolymer.

Hoe ziet TRINIPATCH er uit en wat is de inhoud van de verpakking
Farmaceutische vorm en verpakkingen:
Trinipatch 5 – pleister voor transdermaal gebruik: 7 en 30 pleisters
Trinipatch 10 – pleister voor transdermaal gebruik: 7 en 30 pleisters
Trinipatch 15 – pleister voor transdermaal gebruik: 7 en 30 pleisters

Houder van de vergunning voor het in de handel brengen
SOLVAY PHARMA N.V.
Brg. E. Demunterlaan, 3
B-1090 Brussel - België
Fabrikant
LAVIPHARM S.A. – PO BOX 59 – Agias Marinas St. – Peania Attica – Griekenland
Vergunningsnummer
Trinipatch 5: 410 IS 462 F 15
Trinipatch 10: 410 IS 463 F 15
Trinipatch 15: 410 IS 464 F 15

Neem voor alle informatie met betrekking tot dit geneesmiddel contact op met uw arts of uw apotheker.
Desgewenst kunt u ook contact opnemen met de registratiehouder
SOLVAY PHARMA N.V.
Brg. E. Demunterlaan, 3
B-1090 Brussel
Tel: 02-422 27 11

Afleveringswijze: Op medisch voorschrift.

Datum van laatste oppuntstelling / goedkeuring van de bijsluiter
A. Deze bijsluiter is voor het laatst herzien in mei 2007.
B. De datum van goedkeuring van deze bijsluiter is vermeld op het registratieattest (maand/jaar): 10/2007

NOTICE : INFORMATION DE L'UTILISATEUR

TRINIPATCH

Nitroglycérine

Veuillez lire attentivement l'intégralité de cette notice avant d'utiliser ce médicament.
- Gardez cette notice, vous pourriez avoir besoin de la relire.
- Si vous avez d'autres questions, si vous avez un doute, demandez plus d'informations à votre médecin ou à votre pharmacien.
- Ce médicament vous a été personnellement prescrit. Ne le donnez jamais à quelqu'un d'autre, même en cas de symptômes identiques, cela pourrait lui être nocif.
- Si l'un des effets indésirables devient sérieux ou si vous remarquez un effet indésirable non mentionné dans cette notice, parlez-en à votre médecin ou à votre pharmacien.

Contenu de cette notice

1. Qu'est-ce que TRINIPATCH et dans quel cas est-il utilisé ?
2. Quelles sont les informations à connaître avant d'utiliser TRINIPATCH ?
3. Comment utiliser TRINIPATCH ?
4. Les effets indésirables éventuels
5. Comment conserver TRINIPATCH ?
6. Informations supplémentaires

1. Qu'est-ce que TRINIPATCH et dans quel cas est-il utilisé ?

Groupe pharmacothérapeutique: TRINIPATCH est un dérivé nitré pour application sur la peau agissant par dilatation des vaisseaux.

Indications thérapeutiques: Prévention des crises d'angine de poitrine, seul ou combiné avec d'autres médicaments anti-angineux tels que les bêta-bloquants et/ou les antagonistes du calcium.
TRINIPATCH n'est pas destiné à couper une crise d'angine de poitrine.

2. Quelles sont les informations à connaître avant d'utiliser TRINIPATCH ?

N'utilisez pas TRINIPATCH dans les cas suivants :
- Sensibilité excessive aux dérivés nitrés ou à un des composants du système transdermique;
- insuffisance grave de la circulation due à un mauvais fonctionnement du cœur;
- tension élevée à l'intérieur du crâne;
- une anémie grave;
- une tension basse ;
- un état de choc
- une faiblesse du cœur

Le système doit être impérativement enlevé avant de réaliser un choc électrique externe ou un traitement utilisant l'électricité.

Utilisation de TRINIPATCH en association avec d'autres médicaments :
Veuillez informer votre médecin ou votre pharmacien si vous prenez d'autres médicaments ou si vous en avez pris récemment même s'il s'agit de médicaments obtenus sans ordonnance.

Vu les interactions possibles, l'usage concomitant du TRINIPATCH avec des inhibiteurs de la phosphodiestérase de type 5 tels que sildenafil (Viagra), vardénafil (Levitra) et tadalafil (Cialis) - médicaments utilisés dans le traitement des troubles de l'érection - est contre-indiqué.

Vu les interactions possibles, l'usage concomitant du TRINIPATCH avec le sildenafil (Viagra), le vardénafil (Levitra) et le tadalafil (Cialis) médicaments utilisés dans le traitement des troubles de l'érection, l'usage du TRINIPATCH dans les 24 heures après l'utilisation de ces médicaments et l'usage de ces médicaments dans l'heure qui suit l'enlèvement du TRINIPATCH sont contre-indiqués.

En cas de traitement par TRINIPATCH, le risque d'une diminution de la tension, principalement en position debout, peut être accentué lors d'association de médicaments qui dilatent les vaisseaux, qui favorisent la production d'urine, de médicaments contre l'hypertension, contre la dépression (antidépresseurs tricycliques), contre des maladies mentales (neuroleptiques) ou avec des médicaments qui contiennent de l' hydroergotamine.

L'usage concomitant du TRINIPATCH avec le sildenafil (Viagra), le vardénafil (Levitra) et le tadalafil (Cialis) -médicaments utilisés dans le traitement des troubles de l'érection - peut provoquer une chute importante de la tension.

Faites attention si vous prenez déjà d'autres médicaments. Veuillez lire également la rubrique "utilisation de TRINIPATCH en association avec d'autres médicaments".
- Eviter l'arrêt brutal du traitement qui risquerait de provoquer une crise angineuse. Suivre attentivement les instructions de votre médecin.
- Au moment d'appliquer TRINIPATCH sur la peau, asseyez-vous ou couchez-vous; cette position évitera une baisse de tension qui peut se produire en particulier en cas d'association avec des médicaments qui diminuent la tension artérielle.
- En cas d'infarctus du myocarde ou d'insuffisance cardiaque aiguë, n'utiliser ce traitement que sous surveillance médicale.
- Les médicaments qui dilatent les vaisseaux, les médicaments contre l'hypertension et celles qui favorisent la production d'urine peuvent augmenter la diminution de la tension provoquée par les dérivés nitrés, surtout chez les personnes âgées.

Veuillez consulter votre médecin si une des mises en garde mentionnées ci-dessus est d'application pour vous ou si elle l'a été dans le passé.

Utilisation de TRINIPATCH en association avec des aliments ou des boissons :
Eviter de boire de l'alcool pendant le traitement, l'alcool pourrait provoquer une chute de tension et vous pourriez alors avoir des vertiges ou même tomber.

Grossesse
Ne pas utiliser Trinipatch pendant la grossesse
Veuillez demander conseil à votre médecin ou à votre pharmacien avant de prendre tout médicament.

Allaitement
Ne pas utiliser Trinipatch pendant l'allaitement.
Veuillez demander conseil à votre médecin ou à votre pharmacien avant de prendre tout médicament.

Conduite de véhicules et utilisation de machines
Au début du traitement et en cas de tension basse, la prudence est de rigueur chez les conducteurs de véhicules et les opérateurs de machines.

Informations importantes concernant certains composants de TRINIPATCH
---

3. Comment utiliser TRINIPATCH ?

Veuillez suivre rigoureusement ces instructions, à moins que votre médecin vous en ait donné d'autres. En cas d'incertitude, veuillez consulter votre médecin ou votre pharmacien.
Votre médecin vous dira combien de temps vous devrez utiliser TRINIPATCH. N'arrêtez pas prématurément votre traitement.
La dose habituelle en début de traitement est de 1 système TRINIPATCH 5 par jour. Si vous ne réagissez pas suffisamment au médicament, votre médecin peut augmenter la dose.

Mode d'emploi
Le dispositif doit être collé sur la peau à un endroit sain (sans blessure ni rougeur), peu pileux, propre (sans résidus de pommade) et sec (nettoyer et sécher l'endroit prévu), par exemple la cage thoracique au niveau des côtes. Le dispositif peut cependant être posé à d'autres endroits du corps en évitant les seins.
Application du TRINIPATCH transparent
- Enlever le système de son sachet,
- tenir le système de façon à placer la languette face à soi (figure A),
- plier le système et détacher la feuille de protection (figure B),
- coller la partie adhésive sur la peau (figure C),
- retirer la 2eme partie (figure D),
- presser le dispositif transdermique avec la paume de la main ou les doigts pendant une dizaine de secondes et insister sur les bords (figure E),
- se laver les mains.



Chaque jour, retirer et jeter l'ancien dispositif transdermique et appliquer un nouveau dispositif à un autre endroit. Attendre 4 ou 5 jours pour recoller un autre dispositif à un endroit utilisé précédemment pour éviter les phénomènes éventuels d'irritation locale. Pour éliminer les résidus d'adhésif, il est recommandé d'utiliser un solvant approprié (p.e. de l'alcool ou de l'éther).

En cas de décollement spontané (notamment lors de transpiration importante), il convient de mettre en place un nouveau dispositif à un autre endroit et de jeter l'ancien.
Rythme de pose
Se conformer exactement aux conseils du médecin. En général, un dispositif par jour avec possibilité d'interrompre le traitement quelques heures suivant les indications de votre médecin.
Pendant la pose
Le dispositif adhérant bien à la peau, vous avez la possibilité de vous baigner, de prendre une douche ou de faire du sport.

Si vous avez oublié d'utiliser TRINIPATCH:
Pas de donnée disponible.

Effets pouvant apparaître lorsque le traitement par TRINIPATCH est arrêté:
Consultez toujours votre médecin si vous envisagez d'arrêter le traitement.

Si vous avez utilisé plus de TRINIPATCH que vous n'auriez dû:
De fortes doses de nitroglycérine peuvent avoir des effets généraux assez prononcés, notamment une diminution de la tension, une accélération du rythme du cœur, une syncope. Contrairement à ce qui se produit avec les médicaments contenant de la nitroglycérine administrés par la bouche, l'effet de TRINIPATCH peut être supprimé rapidement par retrait du système transdermique.
Le fait de surélever les jambes permet de contrecarrer la chute de la tension et les manifestations syncopales.
Si vous avez utilisé ou pris trop de TRINIPATCH, prenez immédiatement contact avec votre médecin, votre pharmacien ou le Centre Antipoison (070/245245).

4. Effets indésirables éventuels

Comme tous les médicaments, TRINIPATCH peut avoir des effets indésirables.

Les effets indésirables suivants sont fréquents (entre 1/10 et 1/100 patients), peu fréquents (entre 1/100 et 1/1.000 patients), rares (entre 1/1.000 et 1/10.000) ou très rares (moins de 1/10.000).

Système nerveux : *fréquent* : maux de tête - *très rare* : vertige
Somnolence, faiblesse, flou visuel, excitation psychomotrice, étourdissements et vertiges.
Des maux de tête peuvent accompagner l'action du produit en début de traitement, mais disparaissent par la suite. La persistance des maux de tête lors de thérapie intermittente est possible. S'il n'y a pas d'amélioration après thérapie symptomatique, la dose doit être diminuée ou le traitement arrêté.

Troubles cardiaques : *rare* : tachycardie

Troubles du système vasculaire : *rare* : hypotension orthostatique surtout lors du passage de la position couchée à la position debout, flush.
Une diminution de la tension artérielle peut survenir, surtout en position debout.

Tube digestif : *très fréquent* : nausées, vomissements.

Muscle : crampes

Peau : *peu fréquent* : au lieu d'application peuvent survenir inflammation, rougeur, démangeaisons, sensation de brûlure ou irritation de la peau. Les réactions locales de la peau sont banales et permettent de poursuivre le traitement. Ces incidents sont rares lorsque l'on change régulièrement le site d'application. Ce mode d'administration supprime la grande majorité des effets secondaires de type digestif souvent rencontrés avec les comprimés.

Si vous constatez un effet indésirable non mentionné dans cette notice et que vous considérez comme grave, ou si vous ressentez un des effets mentionnés comme étant sérieux, veuillez en informer votre médecin ou votre pharmacien.

5. Comment conserver TRINIPATCH ?

Conserver hors de vue et hors de portée des enfants. Conserver à une température ne dépassant pas 25ºC. Date de péremption : n'utilisez plus TRINIPATCH après la date de péremption figurant sur la boîte après la mention "Ne pas utiliser après" ou "EXP". La date d'expiration est le dernier jour du mois indiqué.

6. Informations supplémentaires

Que contient TRINIPATCH
La *substance active* est la nitroglycerine
- Trinipatch 5 : Nitroglycerin. 22,4 mg pro system. Transderm. 7 cm² in vivo liberat. ca 5 mg/24h
- Trinipatch 10 : Nitroglycerin. 44,8 mg pro system. Transderm. 14 cm² in vivo liberat. ca 10 mg/24h
- Trinipatch 15 : Nitroglycerin. 67,2 mg pro system. Transderm. 21 cm² in vivo liberat. ca 15 mg/24h

Les *autres composants* sont : sorbitan monooleas, acryl. copolymer.

Qu'est ce que TRINIPATCH et contenu de l'emballage extérieur
Forme pharmaceutique et autres présentations :
Trinipatch 5 – dispositif transdermique : 7 et 30 dispositifs transdermiques
Trinipatch 10 – dispositif transdermique : 7 et 30 dispositifs transdermiques
Trinipatch 15 – dispositif transdermique : 7 et 30 dispositifs transdermiques

Titulaire de l'Autorisation de Mise sur le Marché :
SOLVAY PHARMA S.A.
Av. Brg. E. Demunter, 3
B-1090 Bruxelles – Belgique
Fabricant :
LAVIPHARM S.A. – PO BOX 59 – Agias Marinas St. – Peania Attica - Grèce
Numéro de l'Autorisation de Mise sur le Marché :
Trinipatch 5 : 410 IS 462 F 15
Trinipatch 10 : 410 IS 463 F 15
Trinipatch 15 : 410 IS 464 F 15

Prenez contact avec votre médecin ou votre pharmacien pour toute information relative à ce médicament. Si vous le désirez, vous pouvez aussi prendre contact avec le titulaire de l'autorisation de mise sur le marché
SOLVAY PHARMA S.A.
Av. Brg. E. Demunter, 3
1090 Bruxelles
Tel: 02-422 27 11

Mode de délivrance : Sur prescription médicale.

Date de dernière mise a jour / approbation de la notice
A. La dernière mise à jour de cette notice date de 05/2007.
B. La date d'approbation de la notice est mentionnée sur enregistrement (mois/année) : 10/2007